

A prosztata megnagyobbodás értékelésére egy nemzetközi kérdőívet használnak (IPSS):

		Soha	Kevesebb, mint egyszer 5 alkalomból	Az esetek felénél kevesebb	Körülbelül az esetek felében	Több, mint az esetek felében	Szinte mindig
1.	Az elmúlt hónapban hányszor érezte úgy, hogy a vizelés befejezése után nem sikerült teljesen kiürítenie a hólyagját?	0	1	2	3	4	5
2.	Az elmúlt hónapban milyen gyakran kellett újból vizelni 2 órán belül?	0	1	2	3	4	5
3.	Az elmúlt hónapban milyen gyakran kellett a megkezdett vizelést újraindítania vagy többször is abbahagynia?	0	1	2	3	4	5
4.	Az elmúlt hónapban milyen gyakran érezte, hogy nehéz a vizelést visszatartania?	0	1	2	3	4	
5.	Az elmúlt hónapban hányszor ürült a vizelete gyenge sugárban?	0	1	2	3	4	5
6..	Az elmúlt hónapban hányszor kellett erőlködni vagy préselni, hogy a vizelete meginduljon?	0	1	2	3	4	5
		Soha	Egyszer	Kétszer	Háromszor	Négy-szer	Ötször vagy többször
7.	Az elmúlt hónapban lefekvéstől felkelésig hányszor kellett vizelni kimennie?						

A tünetek értékelése:

A tünetek súlyossága	enyhe	közepes	súlyos
IPSS összpontszám	0-7	8-19	20-35
Értékelés	Általában kezelés nem kell, de évente urológiai vizsgálat szükséges	A prosztata megnagyobbodása már vagy gyógyszeres vagy műtéti kezelést igényel	Inkább műtét, vagy tartós katéterviselés szükséges, ritkán gyógyszeres kezelés elégséges

A vizelési tünetek hatása az életminőségre						
Hogyan fogadná, ha a vizeletürítést jellemző jelenlegi állapota az élete hátralévő részében így maradna?						
Örömmel	Elégedetten	Általában kielégítően	Fele részben elégedetten, fele részben elégedetlenül	Általában elégedetlenül	Szomorúan	Borzalmasan
0	1	2	3	4	5	6
Az életminőség összpontszáma=						